

Termos e Condições de Uso

Sistema Esthetic Aligner®

Esses termos e condições se aplicam a todos os casos submetidos ao laboratório Esthetic Aligner®.

Descrição do Sistema

Esthetic Aligner® combina o diagnóstico e plano de tratamento do doutor com uma tecnologia sofisticada para desenvolver uma série de alinhadores individualizados. Os aparelhos são fabricados por um time de Ortodontistas especialistas, com o objetivo de garantir o melhor resultado para cada caso.

Uso do Aparelho

O doutor se responsabiliza por avaliar se os produtos Esthetic Aligner® são apropriados para cada caso. É essencial que os doutores avaliem se o produto é indicado em combinação com attachments estéticos colados (pequenas resinas compostas da cor dos dentes) e/ou outros aparelhos para facilitar movimentos dentários específicos, porque muitas dessas condições estão exclusivamente sob controle e conhecimento do doutor.

Casos indicados

Existem muitos casos de doutores que ao se tornarem mais experientes com Esthetic Aligner®, passam a utilizá-lo para casos de pequena, média e grande complexidade. Deixamos a cargo do julgamento de cada profissional de cada doutor a responsabilidade pelo gerenciamento de qualquer condição da saúde bucal presente antes, durante e depois do tratamento com Esthetic Aligner®, incluindo, mas não se limitando, cáries, doenças periodontais, disfunções de ATM, restaurações, etc. A Esthetic Aligner® se reserva ao direito de recusar qualquer caso por qualquer razão incluindo, mas não se limitando a pacientes sem a dentição permanente completamente erupcionada.

Precauções

Os tipos de movimentos abaixo relacionados têm sido identificados como sendo menos previsíveis de serem atingidos somente com Esthetic Aligner®. Com mais experiência com Esthetic Aligner®, doutores podem melhorar a forma como conduzem o tratamento e como gerenciam a cooperação do paciente durante o tratamento, aumentando a previsibilidade desses movimentos. Além disso, doutores experientes podem desenvolver técnicas auxiliares simples para atingir esses movimentos usando botões, elásticos, ou outros aparelhos combinados com Esthetic Aligner®. Deixamos a cargo do julgamento profissional do doutor se e quando os seguintes movimentos deverão ser prescritos: 1) Correção de rotações severas de dentes com forma cilíndrica. 2) Extrusões complexas, particularmente de dentes posteriores, caninos altos, e em fechamento de mordidas abertas anteriores. 3) Translações extensas, frequentemente associadas com extrações de pré-molares.

Responsabilidade

Os doutores que conduzem tratamentos e pacientes serão responsáveis pelos custos de todo e qualquer tratamento auxiliar para se atingir os resultados almejados.

Responsabilidade Jurídica

A Esthetic Aligner® por si e/ou por meio de seus empregados, não poderá se responsabilizar pelo sucesso ou resultado do tratamento ortodôntico, nem, outrossim, por danos causados aos pacientes em tratamento.

Custos, Preços, Garantia

Todos os casos estão sujeitos à política de preços e cobrança da empresa.

Documentações

Documentações submetidas que estão diretamente envolvidas com a fabricação do produto (por exemplo, moldagens, registros de mordida, modelos, etc.) requerem inspeção. As documentações podem não apresentar a qualidade adequada e por isso requererem repetição. Documentações submetidas a Esthetic Aligner® se tornam propriedade da Esthetic Aligner® e não serão devolvidas. Além disso materiais físicos (moldagens, modelos de estudo, registros de mordida, modelos, etc.) enviados a Esthetic Aligner® serão mantidos por no máximo 90 dias antes de serem descartados e/ou arquivados a critério da empresa. Se serviços adicionais para tratamento são requisitados, a Esthetic Aligner® e outros profissionais licenciados e organizações empregando profissionais licenciados podem compartilhar qualquer documentação com objetivos de consulta a respeito do tratamento. A Esthetic Aligner® pode usar as documentações (por exemplo, radiografias, fotografias e modelos de gesso) com objetivos de consultas ortodônticas, objetivos educacionais ou de pesquisa, publicação em revistas profissionais, ou usar em materiais profissionais colaterais, mas não usá-los ou identificar o nome, endereço, fotografia da face inteira ou outra identificação pessoal que tiver o efeito de especificamente identificar o paciente como um indivíduo.

Serviços de Planejamento de Tratamento

Casos não devem ser submetidos a Esthetic Aligner® para planejamento de tratamentos. Casos podem ser submetidos por e-mail a Esthetic Aligner® para uma

“Avaliação do Caso”, isso é, somente para fornecer suporte ou responder uma questão, e não para planejamento.

Riscos Gerais

O uso do sistema Esthetic Aligner® como modalidade de tratamento ortodôntico pode envolver os mesmos tipos de complicações ou problemas que podem ocorrer com os aparelhos ortodônticos convencionais. Muitos desses problemas e inconveniências podem ocorrer sem o tratamento ortodôntico, mas o risco é maior para o indivíduo usando um aparelho ortodôntico. Os riscos associados aos aparelhos ortodônticos convencionais ou com o Sistema Esthetic Aligner® podem incluir os seguintes:

Coroas clínicas pequenas podem apresentar problemas de retenção e inibirem o movimento ortodôntico com os alinhadores. Attachments podem ser requeridos para auxiliar na retenção. O doutor assume total responsabilidade ao tratar tais casos.

A quebra de alinhadores tem uma grande chance de ocorrer em casos com múltiplas ausências dentárias (por exemplo, um em cada dois dentes faltando). O doutor assume total responsabilidade ao tratar tais casos.

Todos os dentes deveriam ser ao menos parcialmente cobertos para se evitar super erupção. Se certos dentes não são cobertos então o doutor que trata esta assumindo a responsabilidade da progressão do tratamento.

Desconforto dentário é esperado na troca de alinhadores pelos novos alinhadores. O período de desconforto varia de paciente para paciente e depende do movimento a ser executado. A gengiva, bochechas e lábios podem ser arranhados ou irritados. Aparelhos ortodônticos podem ser acidentalmente engolidos ou aspirados. Entretanto, não há um risco maior com os alinhadores do que com outro aparelho, como dentaduras ou contenções ortodônticas.

Cáries doença periodontal ou marcas permanentes (por exemplo, descalcificação) em dentes podem ocorrer se os pacientes ingerirem alimentos com açúcar e/ou não escovarem seus dentes adequadamente antes de posicionarem os alinhadores na boca e se acostumarem à adequada manutenção da higiene oral.

A pobre colaboração quanto ao uso dos aparelhos em relação ao número de horas requeridas por dia, o não uso dos alinhadores como indicado, aparelhos perdidos ou quebrados, falta às consultas e dentes com formato atípico podem aumentar o tempo de tratamento e afetar a qualidade dos resultados finais ou a habilidade de se atingir os objetivos desejados.

Dentes podem se mover de suas posições após o tratamento. O uso criterioso de contenções ao final do tratamento ortodôntico deve reduzir essa tendência. Ao longo da vida, a mordida pode mudar indesejavelmente devido a diversas causas, incluindo mudanças pelo crescimento, prática de instrumentos musicais e outros hábitos bucais. Em circunstâncias raras, problemas podem ocorrer também na ATM, causando dor na articulação, dores de cabeça e/ou dores de ouvido.

Para muitos pacientes, o tratamento ortodôntico temporariamente afeta a fala, embora qualquer alteração devida ao uso de alinhadores desapareça em uma ou duas semanas.

A saúde do osso e da gengiva que suportam os dentes pode ser afetada pelo tratamento periodontal, particularmente se a doença já existir e em alguns casos raros onde a condição não parece existir. Inflamação das gengivas e perda de osso de suporte podem ocorrer se a placa bacteriana não é removida com a escovação e uso de fio dentário diários.

Cirurgia dentária (por exemplo, extração de dentes) pode ser necessária em conjunto com o tratamento ortodôntico, especialmente para corrigir apinhamento ou significativa discrepância esquelética. Se tais cirurgias são necessárias, os riscos associados com o tratamento e a anestesia devem ser considerados. Além disso, a cicatrização adequada das áreas cirúrgicas deve ser permitida antes de se iniciar o tratamento.

A condição de um dente que fora anteriormente traumatizado ou significativamente restaurado pode ser agravada pela ortodontia. Em circunstâncias raras isso pode requerer tratamento dentário adicional tal como tratamento endodôntico e tratamento restaurador. Existe também a possibilidade de restaurações já existentes (por exemplo, coroas) possam ser deslocadas e requeiram recimentação ou em alguns casos, substituição. Cobranças adicionais podem ocorrer se o paciente sofrer um significativo tratamento dentário ou trauma durante o tratamento ortodôntico que obrigue a confecção de novos alinhadores.

Em alguns pacientes, o comprimento das raízes dos dentes pode diminuir com o tratamento ortodôntico. Geralmente isso não provoca consequências graves, mas eventualmente pode ser uma ameaça à longevidade dos dentes. Alguns são mais propensos a que isso aconteça do que outros.

Condições médicas sistêmicas podem também afetar o tratamento ortodôntico.