

Términos y Condiciones de Uso Sistema Esthetic Aligner®

Estos términos y condiciones se aplican a todos los casos enviados al laboratorio Esthetic Aligner®.

Descripción del Sistema

Esthetic Aligner® combina el diagnóstico y el plan de tratamiento del doctor con una tecnología sofisticada para desarrollar una serie de alineadores individualizados. Los aparatos son fabricados por un equipo de ortodontistas especialistas, con el objetivo de garantizar el mejor resultado para cada caso.

Uso del Aparato

El doctor es responsable de evaluar si los productos Esthetic Aligner® son apropiados para cada caso. Es esencial que los doctores evalúen si el producto está indicado en combinación con attachments estéticos cementados (pequeñas resinas compuestas del color de los dientes) y/u otros aparatos para facilitar movimientos dentarios específicos, ya que muchas de estas condiciones están exclusivamente bajo control y conocimiento del doctor.

Casos indicados

Existen muchos casos de doctores que, al adquirir más experiencia con Esthetic Aligner®, pasan a utilizarlo en casos de pequeña, mediana y gran complejidad. Dejamos a criterio del juicio profesional de cada doctor la responsabilidad por el manejo de cualquier condición de salud bucal presente antes, durante y después del tratamiento con Esthetic Aligner®, incluyendo, pero no limitándose a, caries, enfermedades periodontales, disfunciones de ATM, restauraciones, etc. Esthetic Aligner® se reserva el derecho de rechazar cualquier caso por cualquier razón, incluyendo, pero no limitándose a, pacientes sin la dentición permanente completamente erupcionada.

Precauciones

Los tipos de movimientos relacionados a continuación han sido identificados como menos previsible de alcanzar únicamente con Esthetic Aligner®. Con más experiencia con Esthetic Aligner®, los doctores pueden mejorar la forma en que conducen el tratamiento y gestionan la cooperación del paciente durante el tratamiento, aumentando la previsible de estos movimientos. Además, los doctores experimentados pueden desarrollar técnicas auxiliares simples para alcanzar estos movimientos usando botones, elásticos u otros aparatos combinados con Esthetic Aligner®. Dejamos a criterio del juicio profesional del doctor si y cuándo deberán prescribirse los siguientes movimientos: 1) Corrección de rotaciones severas de dientes con forma cilíndrica. 2) Extrusiones complejas, particularmente de dientes posteriores, caninos altos y en el cierre de mordidas abiertas anteriores. 3) Traslaciones extensas, frecuentemente asociadas con extracciones de premolares.

Responsabilidad

Los doctores que conducen tratamientos y pacientes serán responsables por los costos de todo y cualquier tratamiento auxiliar para alcanzar los resultados deseados.

Responsabilidad jurídica

Esthetic Aligner®, por sí y/o por medio de sus empleados, no podrá responsabilizarse por el éxito en el resultado del tratamiento ortodóntico ni, asimismo, por daños causados a los pacientes en tratamiento.

Costos, Precios, Garantía

Todos los casos están sujetos a la política de precios y cobros de la empresa.

Documentación

La documentación presentada que está directamente involucrada con la fabricación del producto (por ejemplo, impresiones, registros de mordida, modelos, etc.) requiere inspección. La documentación puede no presentar la calidad adecuada y por ello requerir repetición. La documentación enviada a Esthetic Aligner® se convierte en propiedad de Esthetic Aligner® y no será devuelta. Además, los materiales físicos (impresiones, modelos de estudio, registros de mordida, modelos, etc.) enviados a Esthetic Aligner® se mantendrán por un máximo de 90 días antes de ser descartados y/o archivados a criterio de la empresa. Si se solicitan servicios adicionales para el tratamiento, Esthetic Aligner® y otros profesionales licenciados y organizaciones que empleen profesionales licenciados pueden compartir cualquier documentación con fines de consulta respecto del tratamiento. Esthetic Aligner® puede usar la documentación (por ejemplo, radiografías, fotografías y modelos de yeso) con fines de consultas ortodónticas, fines educativos o de investigación, publicación en revistas profesionales, o uso en materiales profesionales colaterales, pero no utilizará ni identificará el nombre, dirección, fotografía de rostro completo u otra identificación personal que tenga el efecto de identificar específicamente al paciente como individuo.

Servicios de Planificación del Tratamiento

Los casos no deben enviarse a Esthetic Aligner® para planificación de tratamientos. Los casos pueden enviarse por e-mail a Esthetic Aligner® para una "Evaluación del Caso"; es decir, únicamente para brindar soporte o responder una pregunta, y no para planificación.

Riesgos Generales

El uso del sistema Esthetic Aligner® como modalidad de tratamiento ortodóntico puede implicar los mismos tipos de complicaciones o problemas que pueden ocurrir con los aparatos ortodónticos convencionales. Muchos de estos problemas e inconvenientes pueden ocurrir sin tratamiento ortodóntico, pero el riesgo es mayor para el individuo que usa un aparato ortodóntico. Los riesgos asociados con los aparatos ortodónticos convencionales o con el Sistema Esthetic Aligner® pueden incluir los siguientes:

Las coronas clínicas pequeñas pueden presentar problemas de retención e inhibir el movimiento ortodóntico con los alineadores. Pueden requerirse attachments para auxiliar en la retención. El doctor asume total responsabilidad al tratar tales casos.

La fractura de alineadores tiene una gran probabilidad de ocurrir en casos con múltiples ausencias dentarias (por ejemplo, uno de cada dos dientes faltantes). El doctor asume total responsabilidad al tratar tales casos.

Todos los dientes deberían estar al menos parcialmente cubiertos para evitar la sobreerupción. Si ciertos dientes no están cubiertos, entonces el doctor que trata asume la responsabilidad de la progresión del tratamiento.

Se espera incomodidad dental al cambiar los alineadores por nuevos alineadores. El período de incomodidad varía de paciente a paciente y depende del movimiento a

ejecutar. La encía, mejillas y labios pueden sufrir raspones o irritación. Los aparatos ortodónticos pueden ser tragados o aspirados accidentalmente. Sin embargo, no existe un riesgo mayor con los alineadores que con otro aparato, como dentaduras o retenedores ortodónticos.

Caries, enfermedad periodontal o marcas permanentes (por ejemplo, descalcificación) en los dientes pueden ocurrir si los pacientes ingieren alimentos con azúcar y/o no cepillan sus dientes adecuadamente antes de colocar los alineadores en boca y no se acostumbran al mantenimiento adecuado de la higiene oral.

La pobre colaboración respecto del uso de los aparatos en relación con el número de horas requeridas por día, el no uso de los alineadores según lo indicado, aparatos perdidos o fracturados, ausencias a las consultas y dientes con forma atípica pueden aumentar el tiempo de tratamiento y afectar la calidad de los resultados finales o la capacidad de alcanzar los objetivos deseados.

Los dientes pueden moverse de sus posiciones después del tratamiento. El uso criterioso de retenedores al final del tratamiento ortodóntico debe reducir esta tendencia. A lo largo de la vida, la mordida puede cambiar indeseablemente debido a diversas causas, incluyendo cambios por crecimiento, práctica de instrumentos musicales y otros hábitos bucales. En circunstancias raras, también pueden ocurrir problemas en la ATM, causando dolor en la articulación, dolores de cabeza y/o dolores de oído.

Para muchos pacientes, el tratamiento ortodóntico afecta temporalmente el habla, aunque cualquier alteración debida al uso de alineadores desaparezca en una o dos semanas.

La salud del hueso y de la encía que soportan los dientes puede verse afectada por el tratamiento periodontal, particularmente si la enfermedad ya existe y en algunos casos raros donde la condición no parece existir. Puede ocurrir inflamación de las encías y pérdida de hueso de soporte si la placa bacteriana no se elimina con el cepillado y el uso diario de hilo dental.

Puede ser necesaria cirugía dental (por ejemplo, extracción de dientes) junto con el tratamiento ortodóntico, especialmente para corregir apiñamiento o discrepancia esquelética significativa. Si tales cirugías son necesarias, deben considerarse los riesgos asociados con el tratamiento y la anestesia. Además, se debe permitir la cicatrización adecuada de las áreas quirúrgicas antes de iniciar el tratamiento.

La condición de un diente que fue previamente traumatizado o significativamente restaurado puede agravarse por la ortodoncia. En circunstancias raras, esto puede requerir tratamiento dental adicional, como tratamiento endodóntico y tratamiento restaurador. También existe la posibilidad de que restauraciones ya existentes (por ejemplo, coronas) puedan desplazarse y requieran recementación o, en algunos casos, sustitución. Pueden ocurrir cobros adicionales si el paciente sufre un tratamiento dental significativo o trauma durante el tratamiento ortodóntico que obligue a la confección de nuevos alineadores.

En algunos pacientes, la longitud de las raíces de los dientes puede disminuir con el tratamiento ortodóntico. Generalmente esto no provoca consecuencias graves, pero eventualmente puede representar una amenaza para la longevidad de los dientes. Algunos son más propensos a que esto ocurra que otros.

Las condiciones médicas sistémicas también pueden afectar el tratamiento ortodóntico.